


BLUEVAC®-1



Vacuna inactivada frente a la lengua azul, serotipo 1, en suspensión inyectable

COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ml)

Virus de la lengua azul inactivado, serotipo 1, cepa BTV-1/ALG2006/01 E1..... $\geq 10^{6.6}$ DICC₅₀*
*DICC₅₀: Dosis infectiva al 50% en cultivo celular (potencia confirmada en lotes finales mediante desafío en especie de destino).

INDICACIONES DE USO

Ovino: Para la inmunización activa del ganado ovino para reducir los síntomas clínicos y prevenir la viremia producida por el serotipo 1 del virus de la lengua azul.

Bovino: Para la inmunización activa del ganado bovino para prevenir la viremia producida por el serotipo 1 del virus de la lengua azul.

ESPECIES DE DESTINO

Ovino y bovino.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea.

POSOLÓGIA

Dosis:

Ovino: 2 ml.

Bovino: 4 ml.

Pauta de vacunación:

- Primovacunación: Administrar dos dosis separadas por un intervalo de 3 semanas a partir de los 2 meses de edad (nacidos de madres no inmunizadas) o de los 2,5 meses de edad (nacidos de madres inmunizadas).
- Revacunación: El intervalo para la administración de una dosis de recuerdo no ha sido establecido. Por ello, cualquier esquema de revacunación se ajustará a lo establecido por las Autoridades Sanitarias o por el veterinario responsable, teniendo en cuenta la situación epidemiológica local.



GESTACIÓN Y LACTANCIA

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia.

CONTRAINDICACIONES

Ninguna.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRESENTACIÓN

Envase con 1 vial de 100 ml.

Envase con 1 vial de 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Titular: CZ Veterinaria, S.A

Reg. N°: 2025 ESP.

Para más información, consulte la Ficha Técnica.



vêtia®

VETIA ANIMAL HEALTH S.A. Calle Teide nº 4. 28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid

🏠 www.vetia.es

BIOLÓGICOS