

ILOVETMR 200 mg/mL



Antiinfeccioso en solución inyectable

COMPOSICIÓN POR ML

Eritromicina200 mg.

INDICACIONES DE USO

Bovino: Neumonía, mamitis, metritis, pododermatitis por anaerobios y fiebre del transporte.

Ovino: Infecciones de las vías respiratorias superiores.

Porcino: Síndromes respiratorios (neumonía, bronquitis y rinitis), mamitis, metritis y leptospirosis en cerdas.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

POSOLOGÍA

Bovino: 0,22 ml/10 kg p.v./día, durante 5 días consecutivos.

Ovino: 0,11 ml /10 kg de p.v./día, durante 5 días consecutivos.

Porcino: 0,33 ml /10 kg p.v./día, durante 5 días consecutivos.



GESTACIÓN Y LACTANCIA

Los estudios efectuados en animales de laboratorio no han demostrado efectos teratogénicos, tóxicos para el feto o tóxicos para la madre. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación o la lactancia en las especies de destino. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la eritromicina, a otros macrólidos y/o a algún excipiente. No usar en animales con insuficiencia hepática u obstrucción biliar.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

- Bovino: 21 días

- Ovino: 10 días

- Porcino: 10 días

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

PRESENTACIÓN

Envase con 1 vial de 100 ml.

Con prescripción veterinaria.

Titular: CZ Veterinaria, S.A.

Reg. N°: 1236 ESP.

Para más información, consulte la Ficha Técnica.



vêtia[®]

VETIA ANIMAL HEALTH S.A. Calle Teide nº 4. 28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid | www.vetia.es

ANTIINFECCIOSOS inyectables